



# Албрис


---

Рекомендации  
по выращиванию  
томата Албрис



**De Ruiter**

*Grow better together*



## Албрис

Сегмент	Крупно-кистевой томат
Скороспелость	Среднеранний
Растение	Сбалансированное, с сильной энергией роста
Плоды	Округлые, гладкие, однородные, более высокого качества, чем у стандарта
Цвет	Насыщенно-красный снаружи и внутри (FULLRED), с блеском
Масса	140–170 г
Устойчивость к растрескиванию	Высокая
Плотность	Высокая
Сохранность	Высокая
Вкус	Отличный для сегмента, Brix 4.8–5.0°Bx
Способ уборки	Кистями или отдельными плодами
Устойчивость к болезням*	HR ToMV:0-2/ToTV/Pf:A-E/ Fol:0,1/For/Sbl/SI/Ss/ Va:0/Vd:0 IR TSWV:0/On



- // Насыщенно-красный цвет плодов как снаружи, так и внутри (FULLRED);
- // Высокий потенциал урожайности;
- // Обладает отложенным проявлением симптомов ToBRFV в случае заражения.

---

## Особенности

- // Более высокий потенциал урожайности, чем у стандарта (Мерлис);
- // Обладает отложенным проявлением симптомов ToBRFV в случае заражения;
- // Плоды насыщенно-красного цвета снаружи и внутри (FULLRED), более высокого качества, чем у стандарта;
- // Высокие для сегмента вкусовые качества;
- // Хорошая скороспелость и скорость окрашивания плодов;
- // Устойчивость к пятнистому увяданию томата (TSWV);
- // Подходит для выращивания в условиях светокультуры и продленного оборота, продолжительность оборота до 12 месяцев.

---

## Рекомендации по выращиванию

- // Максимальная плотность стеблей в светокультуре — 3,8 ст./м<sup>2</sup>, в продленном обороте — до 3,6 ст./м<sup>2</sup>;
- // В начале оборота особенно необходима генеративная стратегия ведения культуры для формирования сильных кистей;
- // Удаление листа с верхушки растения необходимо для поддержания баланса растения;
- // Желательно использование кистедержателей вплоть до 8-й кисти;
- // Рекомендуется прививка на Максифорт;
- // Рекомендуется нормировка кистей на 5 плодов.



## Рекомендуемый календарь выращивания

### Продлённый оборот



### Светокультура




Рекомендуемые сроки: ■ посев ■ посадка ■ сбор урожая

### Характеристики плодов — лучшие показатели ближе к краю




## Урожайность на экспериментальном участке в Нидерландах

### Светокультура, кг/м<sup>2</sup>




### Продлённый оборот, кг/м<sup>2</sup>



## Урожайность по результатам испытаний в России

### Светокультура, кг/м<sup>2</sup>





## Bayer Crop Science

---

### Monsanto Holland BV

P.O. Box 1050  
2660 BB Bergschenhoek  
The Netherlands  
Tel.: +31 10 529 22 22

### АО «Байер»

Ул. 3-я Рыбинская,  
д. 18, стр. 2,  
г. Москва, РФ, 107113  
Тел.: +7 (495) 234-2000



[vegetables.bayer.com](https://vegetables.bayer.com)



ToBRFV Knowledge Center

*Вся информация, касающаяся гибридов и их продуктивности, предоставленная в устной или письменной форме компанией Байер Групп (Bayer Group) или ее сотрудниками, или агентами, в том числе в этом каталоге, дается из лучших побуждений, но не должна рассматриваться как представление данных относительно производительности и пригодности гибридов, продуктивность которых может зависеть от местных климатических и других условий. Байер Групп (Bayer Group) не несет никакой ответственности за такую информацию.*

*Такого рода информация не является основанием для заключения договора с организациями Байер Групп (Bayer Group), если письменно не оговорено иное.*

*De Ruiter ® является зарегистрированной торговой маркой  
Bayer group © Monsanto Holland B.V.  
Все права защищены 05/2024*