



# Страбини

---

Рекомендации  
по выращиванию  
томата Страбини





## Страбини



Сегмент	Черри томат
Скороспелость	Ранний
Растение	Более сильное и менее короткое растение в сравнении со стандартом (Страбена)
Плоды	Сердцевидные
Цвет	Насыщенно красный снаружи и внутри, с глянцевой кожей
Масса	18–22 г
Устойчивость к растрескиванию	Высокая
Плотность	Хорошая
Сохранность	Хорошая
Вкус	Отличный, Brix 7–8,5°Bx
Устойчивость к болезням*	HR ToMV:0-2/ToTV/Pf:A-E/ Fol:0,1/SbI/SI/Ss IR ToBRFV/Ma/Mi/Mj



---

## Особенности

### Плоды

- // Плоды имеют уникальную форму (клубниковидную/сердцевидную), с насыщенно красной окраской снаружи и внутри, с глянцевой кожицей;
- // Выдающийся вкус благодаря сочетанию Брикс (7–8,5°Вх) и других качественных параметров, выше стандарта (Страбена);
- // Устойчивость к растрескиванию плодов;
- // Очень прочное крепление плода к кисти, плоды не осыпаются.

### Растение

- // Устойчивость к ToBRFV;
- // Сильное и компактное растение;
- // Прямые кисти с множеством цветов. Хорошо подходит для кистевого сбора, кисти можно нормировать по 12–14 плодов;
- // Подходит для выращивания в условиях светокультуры и продленного оборота, продолжительность оборота 12 месяцев;
- // Выровненные кисти с множеством цветков.



## Рекомендации по выращиванию

- // Подходит для выращивания в светокультуре и продленном обороте в профессиональных остекленных теплицах;
- // Максимальная плотность стеблей — 4,5 ст./м<sup>2</sup> (необходимо учитывать специфику условий выращивания);
- // Рекомендуется нормировка на 12–14 плодов на кисти;
- // Генеративная стратегия ведения будет способствовать получению более сильных кистей;
- // Желательна прививка на ДР0141ТХ;
- // При появлении двойных кистей рекомендуется нормировка с оставлением одной кисти в фазе бутонизации во избежание получения неоднородной загрузки растений плодами и разнородного окрашивания плодов.

### Рекомендуемый календарь выращивания

#### Продленный оборот

Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

#### Светокультура

Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

Рекомендуемые сроки: ■ посев ■ посадка ■ сбор урожая





---

*Вся информация, касающаяся гибридов и их продуктивности, предоставленная в устной или письменной форме компанией Байер Груп (BayerGroup) или ее сотрудниками, или агентами, в том числе в этой брошюре, дается из лучших побуждений, но не должна рассматриваться как представление данных относительно производительности и пригодности гибридов, продуктивность которых может зависеть от местных климатических и других условий.*

*Байер Груп (Bayer Group) не несет никакой ответственности за такую информацию. Такого рода информация не является основанием для заключения договора с организациями Байер Груп (Bayer Group), если письменно не оговорено иное.*

*De Ruiter ® является зарегистрированной торговой маркой Bayer group © Monsanto Holland B.V. Все права защищены 02/2024*